

# CARTILAGO FORTE® Senior



## COMPRIMIDOS PALATABLES

### USO VETERINARIO

### VENTA BAJO RECETA

#### Composición:

Cada comprimido palatable de 2,0 g contiene: Condroitin Sulfato "A", 0.200 g; Glucosamina Sulfato, 0.300 g; Taurina, 0.125 g; Vitamina E 50%, 0.050 g; Cobre Gluconato, 0.010 g; Zinc Gluconato, 0.020 g; Omega 3, 0.200 g; Vehículo cs.

**Indicaciones:** Antiartrítico. Antiartrósico. Regenerador del cartilago articular.

Reduce la inflamación de las articulaciones, aumenta la viscosidad del líquido sinovial y alivia el dolor.

#### **Indicado especialmente en perros y gatos de edad avanzada.**

Sus componentes dietéticos nutricionales Omega 3, Vitamina E, Taurina y minerales complementan un tratamiento adecuado para perros y gatos de edad avanzada.

**Dosis:** La posología se ajustará según la patología a tratar y al criterio del veterinario actuante. Se recomienda como dosis de orientación:

**Perros hasta 15 kg. de peso:** 1/2 comprimido por día durante 4 semanas seguidas.

**Perros de 15 a 30 kg. de peso:** 1 comprimido por día durante 4 semanas seguidas, repartido en una o dos tomas diarias.

**Perros de más de 30 kg. de peso:** 2 comprimidos por día durante 4 semanas seguidas, repartido en una ó dos tomas diarias.

**Gatos adultos:** 1/2 comprimido por día durante 4 semanas seguidas.

La duración del tratamiento es de 4 semanas. Dependiendo de la respuesta clínica y el criterio del médico veterinario actuante se continuará con un tratamiento de mantenimiento por 30 días o el tiempo que éste considere necesario, en especial en patologías crónicas de origen geriátrico y cardiomiopatías relacionadas.

**Efectos adversos:** Pueden presentarse fenómenos de hipersensibilidad. Por sus componentes cardiotónicos, en dosis mayores a las recomendadas se pueden observar fenómenos de taquicardia. Otros efectos: náuseas, vómitos, diarreas. Consultar al médico veterinario.

**Contraindicaciones:** No administrar conjuntamente con anticoagulantes, tratamientos digitálicos y beta bloqueantes.

**Precauciones:** No administrar en hembras preñadas o en lactancia. Usar con precaución en pacientes en tratamiento con depresores del sistema nervioso central.

En caso de ingestión accidental, procurar atención médica o concurrir al centro toxicológico más cercano.

Conservar entre 15 y 25°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

**Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160 (Arg.)**



INDUSTRIA ARGENTINA

Elaborado por: Pharmadevelop - Estab. N° 8471- Arregui 3910 - CP 1417 - Cdad. de Buenos Aires - Argentina

Para: **Laboratorios Janvier SRL** - N° de Insc. 12.336 - Bahía Blanca 2338/40 - CP1417

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel 054 11 4648 2627 - [www.laboratoriosjanvier.com.ar](http://www.laboratoriosjanvier.com.ar)

Dir. Técnica: Carola Caminos, Farmacéutica MN 14981

**Panama: Reg. N° RF-7812-16**

*Dosis:* .....

.....

.....  
Veterinario actuante