



# OTOVIER ORAL®

## Complemento Dietario

CARICA PAPAYA / ECHINACEA / CHIA

Complemento Dietario - Venta Libre

Conservar entre 15 y 25 °C

### Composición

Cada comprimido de 1 g. contiene:

· Extracto seco de <i>Carica papaya</i>	100 mg
· Extracto seco de <i>Echinacea angustifolia</i>	200 mg
· Extracto seco de Chía <i>Salvia hispanica</i>	200 mg
· Excipientes	c. s.

### INDICACIONES DE USO

OTOVIER ORAL es un complemento dietario que ayuda a mantener la salud del oído en perros y gatos.

Su composición garantiza un aporte óptimo de sustancias alimentarias que permiten controlar la producción de serum auricular, impidiendo una excesiva respuesta flogística y, por lo tanto, un cambio en el entorno del oído que favorezca el desarrollo de levaduras y bacterias patógenas causantes de los principales problemas otológicos, tales como: otohematomas, otitis externa, media, aguda y crónica, de origen bacteriano, micótico, alérgico y otras de etiología no bien determinada.

**Extracto seco de *Carica papaya*:** la papaya es una enzima proteolítica extraída de la papaya que ayuda a disminuir las molestias causadas por los procesos inflamatorios. Ayuda a prevenir el efecto fibrinolítico y antiedematoso presente en la mayoría de las inflamaciones que cursan en las otitis agudas y crónicas, por sus propiedades antioxidante y antimicrobiana.

**Extracto seco de *Echinacea angustifolia*:** es estimulante del sistema inmunológico. Favorece la activación de las células NK ("natural killer") y los macrófagos, e incrementa las concentraciones de interferon alfa en la circulación sanguínea. Los ésteres cafeicos de la equinácea contribuyen a la actividad bacteriostática, favoreciendo los tratamientos médicos habituales.

**Los ácidos grasos Omega 3 aportados por la chía** tienen un rol estructural en las membranas celulares, actuando como precursores para sustancias eicosanoideas como las prostaglandinas y los leucotrienos, siendo vitales para mantener la estructura y la funcionalidad cutánea.

Los animales con deficiencia de ácidos grasos presentan descamación fina generalizada de la piel. Estas alteraciones también comprometen al pabellón auricular y al conducto auditivo.

### DOSIFICACIÓN

Administrar al animal junto con el alimento y verificar que la toma indicada sea ingerida en su totalidad.

Dosis:

- ½ comprimido por día en caninos y felinos de hasta 5 kg de peso, repartido en una o dos tomas diarias.
- 1 comprimido por día en caninos de 5 a 10 kg de peso, repartido en una o dos tomas diarias.
- 2 comprimidos por día en caninos de más de 10 kg de peso, repartidos en una o dos tomas diarias.

La duración del tratamiento estará sujeta al criterio del médico veterinario. Se recomienda utilizar conjuntamente con el tratamiento farmacológico para patologías óticas.

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

No administrar a animales con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. El envase no constituye un factor de riesgo para el medio ambiente.

### Dosis

Veterinario actuante