



PANTOVIER®

Comprimidos Recubiertos

PANTOPRAZOL

Venta Bajo Receta

Conservar entre 15 y 30 °C

CLASIFICACIÓN

MEDICAMENTO PARA EL APARATO DIGESTIVO -
ANTIULCEROSO.

INDICACIONES

El producto se indica para el tratamiento o la prevención de las patologías relacionadas con el ácido gástrico como gastritis, erosiones gástricas, úlceras gástricas en caninos y felinos. Tratamiento de esofagitis por reflujo. Prevención y tratamiento de las erosiones gástricas inducidas por fármacos ulcerogénicos, como antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, antibióticos, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Se recomienda administrar un comprimido cada 10 o 20 kg de peso, cada 24 hs, equivalente a una dosis de 0,5 – 1 mg/kg/día.

La posología se ajustará según la patología a tratar y el criterio del médico veterinario.

Los fármacos inhibidores de la bomba de protones, como el pantoprazol, tardan en hacer efecto máximo entre 2 y 5 días, cuando son administrados por vía oral.

Se recomienda realizar el tratamiento con pantoprazol por un período de 10 a 30 días.

EFFECTOS ADVERSOS

El pantoprazol es una droga relativamente segura, y se han reportado pocos efectos adversos. Raramente puede causar disminución del apetito, vómitos, meteorismo y diarrea, que remiten a corto plazo. De persistir, se debe consultar al veterinario.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

Centro Nacional de Intoxicaciones **0800-333-0160**

Composición

- Cada comprimido recubierto de **Pantovier 10 mg** contiene: Pantoprazol (como pantoprazol sódico sesquihidrato) 10 mg, excipientes c.s.p. 170 mg.
- Cada comprimido recubierto de **Pantovier 20 mg** contiene: Pantoprazol (como pantoprazol sódico sesquihidrato) 20 mg, excipientes c.s.p. 340 mg.

ANTAGONISMOS FARMACOLÓGICOS

No administrar con medicamentos que dependen del ácido del estómago para la absorción, por ejemplo, ketoconazol, itraconazol, suplementos de hierro, ésteres de ampicilina.

El sucralfato puede disminuir la biodisponibilidad del pantoprazol administrado por vía oral. El pantoprazol puede aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina.

CONTRAINDICACIONES

El pantoprazol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a la droga o a otros benzimidazoles sustituidos.

Utilizar con precaución en hembras preñadas y en lactación.

PRECAUCIONES

Los comprimidos deben darse enteros, no partidos ni triturados.

Se recomienda administrar 30-45 minutos previos a la provisión del alimento, o en forma simultánea.

El envase no constituye un factor de riesgo para el medio ambiente. Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.